

	Límite máximo residual LMR (ppb) µg/kg													
	Leche		Huevos		Músculo		Hígado		Riñón		Grasa		Pescado	
	EU	FDA	EU	FDA	EU	FDA	EU	FDA	EU	FDA	EU	FDA	EU	FDA
Tetraciclinas														
Tetraciclina	100	80	200		100	2000	300	6000	600	12000		12000		
Oxitetraciclina	100	30	200		100	2000	300	6000	600	12000		12000		2000
clortetraciclina	100	30	200	400	100	2000	300	6000	600	12000		12000		
Sulfonamidas														
Residuo total de sulfonamida	100				100		100		100		100			
Sulfabromometazina (ganado)		10				100		100		100		100		
Sulfacoloropiridazina (pollos)						0		0		0		0		
Sulfacoloropiridazina (terneros, cerdos)						100		100		100		100		
Sulfadimetoxina		10				100		100		100		100		100
Sulfaetoxipiridazina (Ganado)		0				100		100		100		100		
Sulfaetoxipiridazina (cerdo)						0		0		0		0		
Sulfamerazina (trucha)														0
Sulfametazina						100		100		100		100		
Sulfanitrán (pollos)						0		0		0		0		
Sulfaquinoxalina						100		100		100		100		
Sulfatiazol (cerdo)						100		100		100		100		
Quinolonas														
Danofloxacin (ganado)	NP				200		400		400		100			
Danofloxacin (pollos)			NP		200		400		400		100			
Decoquinato (ganado)					500		500		500		500			
Difloxacin (pollos, pavos)					300		1900		600		400			
Enrofloxacin (pollos, pavos)					30	300	30		30					

Enrofloxacin (ganado)	30	30	100	30			
Enrofloxacin (cerdo)	30	30		30			
Marbofloxacin (ganado)	150	150		150		50	
Marbofloxacin (cerdo)	150	150		150		50	
Sarafloxacin (pollos, pavos)		NR	100	NR		NR	10
Sarafloxacin (Salmon)							NR
Cloranfenicol (MRPL)	0.3	0.3					30

Tabla 1. Niveles de tolerancia de antibióticos en comidas estipulados por la Unión Europea (EU) y la administración de drogas y alimentos de USA (FDA)